

<b>HIV/HEPATİT TANI TESTLERİ RASYONEL TEST İSTEM TABLOSU</b>		
<b>TEST</b>	<b>TESTİN İSTENİLME GEREKÇELERİ</b>	<b>SINIRLAMALAR</b>
HBsAg	- Kan transfüzyonu öncesi kan bağışçısının transfüzyonla bulaşan enfeksiyonlar yönünden taranmasında - Organ transplantasyonu öncesi organ bağışçısının taranmasında - Viral hepatitlerin tanı ve ayırıcı tanısında	- Akut ve kronik HBV enfeksiyonunun tanı, ayırıcı tanı ve tedavi takibinde - *Preoperatif tarama testi olarak kullanılmamalıdır.
Anti-HBs	- Geçirilmiş HBV enfeksiyonu ve bağışıklık durumu - Aşı ile bağışıklık durumu	-
Anti-HBc IgM, anti-HBc IgG	- Akut ve kronik HBV enfeksiyonunun tanı ve ayırıcı tanısı	-Anti- HBc IgG HBV ile teması gösterir. - Aşılama öncesi incelenmelidir.
HBeAg, anti-HBe	- Akut ve kronik HBV enfeksiyonunun tanı ve ayırıcı tanısı	-
Anti-HCV	-Kan transfüzyonu öncesi kan bağışçısının transfüzyonla bulaşan enfeksiyonlar yönünden taranmasında - Organ transplantasyonu öncesi organ bağışçısının taranmasında - Viral hepatitlerin tanı ve ayırıcı tanısında	- *Preoperatif tarama testi olarak kullanılmamalıdır.
Anti-HAV IgM	- Viral hepatitlerin tanı ve ayırıcı tanısında	-
Anti-HAV IgG	- Geçirilmiş HAV enfeksiyonu ve bağışıklık durumu - Aşı ile bağışıklık durumu	-
Anti-HIV	-Kan transfüzyonu öncesi kan bağışçısının transfüzyonla bulaşan enfeksiyonlar yönünden taranmasında - Organ transplantasyonu öncesi organ bağışçısının taranmasında - HIV enfeksiyonu tanısında	-* Preoperatif tarama testi olarak kullanılmamalıdır.

\* HBsAg, anti-HCV ve anti-HIV testlerinin ülkemizde preoperatif tarama testi olarak yaygın biçimde kullanılıyor olması gereksiz yere tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarlarında iş yükünü artırmakta ve hasta tedavi hizmetlerinde maliyet artışlarına neden olmaktadır.